

ພະຍາດໃບດ່າງ ຂອງມັນຕົ້ນ

Cassava mosaic virus (CMV)

ພະຍາດໃບດ່າງຂອງມັນຕົ້ນແມ່ນພະຍາດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັດ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປູກມັນຕົ້ນ, ໃນປະຈຸບັນມີລາຍງານທັງໝົດ 10 ຊະນິດ, ໃນນັ້ນພົບຢູ່ທະວີບ ອາຟຣິກາ 8 ຊະນິດ ແລະ ພົບຢູ່ທະວີບ ອາຊີ 2 ຊະນິດເຊັ່ນ: Indian cassava mosaic virus (ICMV) ພົບຢູ່ປະເທດອິນເດຍ ແລະ Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) ພົບຢູ່ປະເທດສິລັງກາ, ອິນເດຍ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ. ສຳລັບປະເທດລາວພົບຄັ້ງທຳອິດຢູ່ ບ້ານ ບຶງງາມ, ເມືອງ ໂຂງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ. ຖ້າພະຍາດໃບດ່າງລະບາດຢ່າງຮຸນແຮງໃນຊ່ວງໄລຍະ 2 ເດືອນທຳອິດ ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມັນຕົ້ນບໍ່ສ້າງຫົວ, ຫົວນ້ອຍ-ລົບ ແລະ ຜະລິດແປ້ງໜ້ອຍເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຫລຸດລົງ 80-100% (ດັ່ງຮູບທີ 1)



ມັນຕົ້ນປົກກະຕິ

ມັນຕົ້ນເປັນພະຍາດ

ຮູບທີ 1: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຫົວມັນຕົ້ນຂອງຕົ້ນທີ່ເປັນພະຍາດ ແລະ ຫົວຂອງຕົ້ນທີ່ປົກກະຕິ



ໃບມັນຕົ້ນປົກກະຕິ

ອາການພະຍາດໃບດ່າງ

ຮູບທີ 2: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໃບມັນຕົ້ນທີ່ປົກກະຕິ ແລະ ໃບມັນຕົ້ນທີ່ເປັນພະຍາດ

ລັກສະນະອາການຂອງພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ

ລັກສະນະອາການພະຍາດຢູ່ໃບ ມີລັກສະນະໃບດ່າງ, ໃບກຸດງໍ ເຮັດໃຫ້ໃບເສຍຮູບຊົງ. ອາການໃບດ່າງມີຫລາຍແບບເຊັ່ນ: ໃບດ່າງຂຽວສະຫລັບຂຽວເຂັ້ມ ແລະ ໃບດ່າງເຫລືອງສະຫລັບຂຽວ, ໃບອ່ອນມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ, ຕົ້ນເຕັ້ຍ, ຢູ່ສ່ວນຍອດຈະເຫັນໃບດ່າງເຫລືອງສະຫລັບຂຽວຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່ໃບລຸ່ມຍັງປົກກະຕິ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດພະຍາດຈາກແມງຫວີຂາວຢາສູບ ທີ່ມີເຊື້ອໄວຣັດໃບດ່າງມັນຕົ້ນຈຶ່ງສະແດງອາການຈາກສ່ວນຍອດລົງມາສູ່ໃບລຸ່ມຂອງຕົ້ນ.

ພຶດຕະກຳ

ພຶດຕະກຳຂອງເຊື້ອໄວຣັດສາເຫດຂອງພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ, ໝາກຫຸ່ງສາ, ໝາກເຢົາ ແລະ ພຶດຕະກຳຕົ້ນເປົ້າ

ພຶດຕະກຳຂອງແມງຫວີຂາວ

ພຶດຕະກຳຖົ່ວ, ຕະກູນແຕງ, ຕະກູນໝາກເລັ່ນ, ຜັກກະເຟົາ, ຜັກປົວລະຟາ, ຫອມປ້ອມ, ຫອມລາບ ແລະ ຜັກອື່ນໆ

ການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ປ້ອງກັນທ່ອນຜັນຕິດພະຍາດ

- ຕ້ອງໝັ້ນຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອນປູກຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມປູກທຸກໆ 2 ອາທິດ ຫາກພົບອາການທີ່ຄ້າຍໃບດ່າງ, ໃບກຸດງໍ ໃຫ້ແຈ້ງພະນັກງານເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ພະນັກງານສູນປ້ອງກັນພຶດ.
- ໃຫ້ທຳລາຍສວນມັນຕົ້ນທີ່ເປັນພະຍາດໃບດ່າງທັງໝົດໃນຂອບເຂດວົງກວ້າງ 1 ກມ.
- ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍທ່ອນຜັນມັນຕົ້ນ ແລະ ທຸກຊັ້ນສ່ວນຂອງມັນຕົ້ນອອກຈາກສວນຢ່າງເດັດຂາດ.
- ສຳລັບແມງຜາຫະ:
 - ການຄວບຄຸມດ້ວຍວິທີຊີວະວິທະຍາ ສາມາດໃຊ້ ແມງຊ້າງປີກໃສ, ໂຕຫ້າແຕນບຽນ ແລະ ເຊື້ອລາ ບູເວີເລຍ
 - ການຄວບຄຸມດ້ວຍສານເຄມີ ນຳໃຊ້ imidacloprid 70% WG ອັດຕາ 12 ກຼາມ ຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

- ເຝົ້າລະວັງພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ. ກຸ່ມວິໄຈການກັກກັນພຶດ, ກຸ່ມວິຊາການກະເສດ, ປະເທດໄທ. 2019.
- ບົດລາຍງານການວິໄຈ ແລະ ການສຳຫລວດພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ. ສູນປ້ອງກັນພຶດ, ກົມປູກຝັງ. 2020.

ການແຜ່ລະບາດ

ແມງຜາຫະ (Vector)

ແມງຫວີຂາວ (Whitefly)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Bemisia tabaci*



ໄລຍະຕົກແຕ່



ໄລຍະໂຕແກ່

ຮູບທີ 3: ແມງຫວີຂາວໄລຍະຕົກແຕ່ ແລະ ໄລຍະໂຕແກ່ຕິດໄປນຳທ່ອນຜັນ ຫຼື ແນວຜັນ



ຮູບທີ 4: ທ່ອນຜັນມັນຕົ້ນ



ສູນປ້ອງກັນພຶດ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
Km 13, ຖະໜົນທ່າເດື່ອ, ບ້ານ ນາໄຫ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຝອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ/ແຟກ: +856 21 812164

